

Dystrybucja tabletek jodku potasu

Dystrybucja preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Siekierzyn

Prosimy mieszkańców gminy Siekierzyn o zapoznanie się z rozmieszczeniem punktów wydawania preparatu stabilnego jodu w postaci tabletek jodku oraz tabelą dawkowania.

Informacja ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość gdzie się zgłosić oraz w jaki sposób odbywa się wydanie preparatu. Niemniej jeśli dojdzie do ww. zdarzenia będzie ono komunikowane w mediach, a po wydaniu zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego, także za pośrednictwem mediów lokalnych z określeniem rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie gminy Siekierzyn.

Wykaz punktów wydawania preparatów jodowych na terenie gminy Siekierzyn:

1. **Remiza OSP w Rudzicy**, Rudzica 58, 59-818 Rudzica
2. **Ośrodek Zdrowia w Siekierzynie**, Siekierzyn 341, 59-818 Siekierzyn
3. **Ośrodek Zdrowia w Zarębie**, ul. Jana Pawła II 2, 59-800 Zaręba
4. **Świetlica wiejska w Wesołowce**, Wesołówka 16, 59-800 Wesołówka
5. **Świetlica wiejska w Nowej Karczmie**, Nowa Karczma 23a, 59-818 Nowa Karczma
6. **Świetlica wiejska w Wyrębie**, Wyręba 8, 59-818 Wyręba

WYKAZ GRUP WIEKOWYCH OBJĘTYCH PROFILAKTYKĄ WRAZ ZE SPOSOBEM PODAWANIA I INFORMACJĄ O PREPARATACH JODOWYCH

Zgodnie z rekomendacją Ministra Zdrowia preparat jodowy otrzymują wszystkie osoby do 60 roku życia.

Lp	Opis grupy ryzyka	Dawkowanie i sposób podawania
1	Noworodki i niemowlęta do 1 miesiąca życia	Jednorazowo ¼ tabletki (12,5 mg jodu) . Tabletkę należy całkowicie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu i podać dziecku.
2	Niemowlęta powyżej 1 miesiąca życia i dzieci do 3 roku życia.	Jednorazowo ½ tabletki (25 mg jodu) . Tabletkę należy całkowicie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu i podać dziecku.
3	Dzieci powyżej 3 roku życia do 12 lat.	Jednorazowo 1 tabletkę (50 mg jodu) . Tabletkę należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem. Tabletkę można pokruszyć i dodać do chłodnego napoju.
4	Dzieci powyżej 12 lat i dorośli do 60 lat.	Jednorazowo 2 tabletki (100 mg jodu) . Tabletkę należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem.
5	Kobiety w ciąży (każdy wiek)	Jednorazowo 2 tabletki (100 mg jodu) . Tabletkę należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem.

Jednorazowo 2 tabletki (100 mg jodu). Tabletkę należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem.

Zestawienie zbiorcze punktów dystrybucji tabletek jodku potasu na obszarze województwa dolnośląskiego:

<https://www.duw.pl/pl/dla-mediow/aktualnosc/18443,Komunikat-Zestawienie-zbiorcze-punktow-dystrybucji-tabletek-jodku-potasu-na-obsz.html>

Państwowa Agencja Atomistyki: <https://www.gov.pl/web/paa>